

Kevätvehnä

KWS MISTRAL

Kauan kaivattu tien näyttäjä ke- vätvehnän viljelyyn

Alkuperä

Saksalainen, jalostaja KWS LOCHOW GMBH.
Edustaja Suomessa Raisioagro Oy.

Kasvuaika

Päätyypin kevätvehnä, kaksi päivää Amaretttoa aikaisem-
pi.

Sato

KWS Mistral erottuu muista lajikkeista satoisuudellaan.
Se on ollut lajikekokeissa 9% Amaretttoa satoisampi.

Korsi

Erittäin korrenluja lajike, vaikka korren pituus on keski-
määräistä pidempi.

Sadon laatu

KWS Mistralin tuhannen jyvän ja hehtoliträn painot
ovat huippuluokkaa. Lajikkeen valkuaispitoisuus on
hieman keskimääräistä pienempi, jos typpilannoitusta ei
optimoida KWS Mistralille. Lajike luokitellaan Saksassa
laadultaan A-tyypin vehnäksi (hyvä myllyvehnä).

Viljelysuositus


KWS Mistral hyöttyy voimaperäisestä viljelystä. Se on
antanut hyvän vasteen jaetulle typpilannoitukselle sadon
määrässä ja valkuaispitoisuudessa.

KWS Mistralin korsi on luja ja taudinkestävyys vähin-
tään keskitasoa. On syytä kuitenkin varmistaa laon-
kestävyys pienellä annoksella kasvunsäädettä. Tautien
torjunnassa on tarkkailtava viime vuosina yleistynyttä
keltaruostetta ja tähkä on syytä suojata ruskolaikulta.


KEVÄTVEHNÄ




Satoisuus ja kasvu-aika



Korren pituus ja lako%



Sakoluku ja valkuainen



Lajike	Kok. kpl	Sato kg/ha	Kasvu-aika, pv	Lako-%	Pituus cm	Tjp g	Hlp kg	Valk.%	Sako-luku 1
KWS MISTRAL	28	6 511	104,3	5,7	83,9	41,5	80,6	12,5	216
SIBELIUS	14	6 443	106,3	7,7	81,1	41,3	78,8	13,0	257
KWS SOLANUS	27	6 369	106,7	15,4	88,8	43,3	79,9	13,2	182
LICAMERO	14	6 292	105,8	4,9	83,6	43,6	78,8	12,7	194
AMARETTO	57	6 175	106,3	10,9	89,1	38,2	78,6	12,0	240
DEMONSTRANT	29	5 919	105,1	1,8	83,5	35,5	78,5	12,8	260
QUARNA	4	5 735	102,9	0,0	80,2	37,0	79,7	14,7	271
HELMİ	12	5 721	98,6	6,1	82,5	36,2	76,7	13,7	228
KREIVI	13	5 660	103,7	4,4	82,7	35,5	77,9	12,9	303
LENNOX	14	5 603	104,8	8,2	78,6	40,3	78,5	13,5	260
ANNIINA	3	5 143	98,0	0,4	84,6	34,4	78,6	15,1	228

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2010 - 2017, kevätvehnä, px.luke.fi