

WPB Troy

KEVÄTVEHNÄ

Etelässä suurimman sadon tuottava

- Tuottaa runsaan ja laadukkaan sadon
- Valkuaispitoisuudeltaan vehnien kärkeä
- Lujakortinen lajike, joka kestää voimaperäistä viljelyä

WPB Troy on I-viljelyvyöhykkeen satoisin kevätvehnälajike. Sen valkuaispitoisuus on vehnien parhaimmistoa. WPB Troy on erittäin laonkestävä lajike joka kestää voimaperäistä viljelyä.

WPB Troy oli mukana Västankvarnin lannoituskokeissa kasvukaudella 2021. Koetulosten perusteella sen lannoitukseen kannattaa panostaa, jotta lajikkeen parhaat puolet eli suuri sato ja hyvä valkuaispitoisuus saadaan esille. Kasvukauden 2021 olosuhteissa WPB Troy hyötyi jaetusta lannoituksesta. Paras sato saatiin antamalla kylvön yhteydessä 120 kg N/ha ja kasvukaudella yhteensä 40 kg N/ha typpeä.

WPB Troy on menestynyt hyvin koko kevätvehnän viljelyalueella, suosittelemme sitä viljelyyn I-IIIe vyöhykkeille. Lajike soveltuu viljelyyn kaikille maalajeille ja on menestynyt hyvin myös happamilla mailla.



Lue koodi kameralla
ja lue lisää tilasiemen.fi

Alkuperä ja lajikeoikeudet

Hollantilaisen Wiersum Plant Breedingin jalostama lajike. Edustaja Tilasiemen.

Kasvuaika

Kasvuaika 106,4 päivää.

Sato

WPB Troy on eteläisen Suomen satoisin kevätvehnä. Se on ollut lajikekokeissa 10 % Demonstrantia satoisampi ja I-viljelyvyöhykkeen satoisin vehnä. Menestyy kaikilla maalajeilla, myös happamilla mailla.

WPB Troyn tuhannen jyvän paino ja hehtolitrapaino on huippuluokkaa. Lajikkeen valkuaispitoisuus on yksi parhaimmista.

Korsi

Erittäin korrenluja lajike. Virallisissa kokeissa lakoa on ollut vain 4,7 %.

Taudinkestävyys

WPB Troyn taudinkestävyys on ollut virallisissa kokeissa erittäin hyvä. On hyvä tarkkailla viime vuosina yleistyneitä ruosteita sekä muita tauteja ja tarvittaessa tehtävä torjunta.

Viljelyohje

Kylvötiheys 650 - 700 itävää jyvää neliölle.

Typpilannoitus savimaalla 160 kg N/ha mieluummin jakamalla. Kylvön yhteydessä annetaan 100 - 120 kg N/ha ja pintalevityksenä 40 - 60 kg N/ha. Lannoitustaso on säädettävä maalajin ja kasvuston mukaan.

Yleensä WPB Troy ei tarvitse kasvunsäätelyä, mutta erittäin rehevissä kasvustoissa rikkakasviruiskutuksen yhteydessä voi käyttää pientä annosta kasvunsäätettä. Kasvitautiluiskutus antaa parhaan vasteen, kun se tehdään heti tähkimisen jälkeen. Tautiruiskutus varmentaa jyvien täyttymisen ja normaalin tuleentumisen.

LAJIKE	Koe kpl	Sato kg/ha	Kasvu-aika, pv	Lako-%	Pituus cm	Tjp g	Hlp kg	Valk. %	Sakoluku 1
EMBLA	15	6 848	107,6	12,5	85,0	44,2	79,2	12,5	261
CALISPERO	14	6 644	104,2	10,5	84,7	38,6	77,6	13,2	268
SENNI	13	6 640	106,0	8,5	84,2	42,0	77,9	12,3	239
SELINA	14	6 631	103,1	7,7	86,6	41,6	80,6	12,3	225
WPB TROY	14	6 554	106,4	4,7	76,7	43,6	80,5	13,6	225
LINNEA	14	6 503	102,7	1,5	76,9	41,6	78,4	13,5	211
SIBELIUS	19	6 336	105,8	9,0	77,8	42,5	78,7	13,4	259
LEIJONA	13	6 299	103,2	7,2	78,6	42,3	77,6	13,1	244
KWS MISTRAL	26	6 189	103,3	6,3	79,0	41,8	79,9	13,1	220
AMARETTO (M)	60	6 155	105,4	5,6	85,2	38,9	78,5	12,5	251
ALLI	21	6 026	102,2	1,8	80,8	40,0	76,6	13,0	239
DEMONSTRANT (M)	64	5 977	104,4	2,7	81,1	36,6	78,4	13,1	273
JAARLI	13	5 792	102,8	5,5	80,0	42,6	80,5	13,8	246
HELMI	12	5 629	98,1	5,6	79,0	36,9	76,3	14,1	231
HILKKA	12	5 586	97,5	..	76,4	35,5	78,2	13,5	303
IISAKKI	12	5 537	97,0	1,4	80,8	41,0	77,7	14,5	237
QUARNA	2	5 141	37,5	78,2	16,4	259

Lähde: Viralliset lajikekokeet 2015 - 2022, kevätvehnä, px.luke.fi. Lajiteltu satoisuuden mukaan suurimmasta pienimpään.